

Promovet



Diclofenac-F

Reg. SAGARPA Q-0016-043

**Polvo para suspensión inyectable
USO VETERINARIO**

FÓRMULA: Hecha la suspensión cada 1 ml contiene
Penicilina G sódica 150,000 UI
Penicilina G procaína 150,000 UI
Dihidroestreptomicina sulfato 125 mg
Diclofenaco sódico 12.5 mg
Vehículo c.b.p 1.00

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

DESCRIPCIÓN: **Diclofenac-F** es una combinación antibiótica sinérgica, adicionada con un anti-inflamatorio no esteroide, en polvo para suspensión inyectable.

La penicilina G es un antibiótico β -lactámico de amplio espectro que altera la integridad de la pared bacteriana, ligándose a las proteínas ligadas a penicilinas (PLP's), que intervienen en la formación de la pared bacteriana.

Actúa en contra de gramnegativos y grampositivos y en mucho, el espectro de las penicilinas está determinado por las características de la pared bacteriana.

La dihidroestreptomicina es un aminoglicósido bactericida que inhibe la síntesis de proteínas en bacterias gramnegativas principalmente, al unirse a la subunidad ribosomal 30S, produciendo lecturas genéticas erróneas. Por sí mismo su utilidad clínica está restringida por su espectro y efectos secundarios, al asociarse a β -lactámico se produce un efecto sinérgico que le recalifica como de elección.

El diclofenaco es un anti-inflamatorio no esteroide (AINE), que inhibe de manera no selectiva, a las enzimas COX1 y COX2, bloqueando así la producción de prostaglandinas. Por otros mecanismos parece que también bloquea la producción de leucotrienos. Su efecto se reconoce como analgésico, anti-inflamatorio y antipirético.

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones producidas por bacterias susceptibles a la acción sinérgica de la penicilina en

asociación con la dihidroestreptomicina y en las que se requiera además la acción conjunta de un anti-inflamatorio, analgésico y antipirético. Se indica en infecciones cutáneas, uterinas, del tracto respiratorio superior, neumonías y heridas infectadas.

ESPECIES EN LAS QUE SE INDICA: Bovino (productores de carne y leche), equinos, porcinos, caprino, ovinos y caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda y subcutánea.

DOSIS: En todas las especies animales: hecha la mezcla administre 1 ml por cada 20 Kg de peso. Mantenga el tratamiento al menos durante 3 días consecutivos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 30 días. Leche: 72 horas..

PRECAUCIONES: No se administre a animales con insuficiencia renal o hipersensibles a las penicilinas o cualquier antibiótico β -lactámico. Este producto no lo deberán manipular personas hipersensibles a las penicilinas o cualquier antibiótico β -lactámico. Una vez reconstituido manténgase en refrigeración entre 3 y 7°C. No se congele. No se deje al alcance de los niños. Manténgase en lugar fresco y protegido de la luz. Los AINE's pueden provocar o exacerbar la gastritis, por lo que se recomienda cuidado con el uso en animales que ya presenten este cuadro o por períodos prolongados.

ADVERTENCIAS: No administre este producto a equinos destinados al consumo humano. Producto para uso exclusivo en medicina veterinaria.

PRESENTACIONES: Frasco ampula con polvo y diluyente para 1.5, 3, 6 y 12 MUI.

HECHO EN MEXICO POR:
VETILAB INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
Fray Martín de Porres N° 101, Boulevares de San Francisco,
Pachuca, Hgo.

DISTRIBUIDO EN EXCLUSIVA POR:
Promoción Veterinaria, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto N° 510, Col. Del Valle, México, D.F., 03100
01-800-717-6240 www.promovet.com.mx ventas@promovet.com.mx

Promoción Veterinaria, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto N° 510, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México, D.F., 03100
(55) 5669-4001 01 (800) 717-6240 www.promovet.com.mx

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO