

Promovet



Vetlicina

Reg. SAGARPA Q-0016-025

**Solución inyectable
USO VETERINARIO**

FÓRMULA: Cada 10 ml contienen:
Oxitetraciclina HCl 500 mg
Vehículo c.b.p 10.00 ml

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

DESCRIPCIÓN: La oxitetraciclina HCl es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, que inhibe procesos enzimáticos bacterianos con lo que inhibe la síntesis de proteínas al unirse de manera específica a las subunidades ribosomales 50S y 30S, típicas de las células procariotas aunque las tetraciclinas también inhiben la síntesis de proteínas en células eucariotas, por lo que además de actuar mayormente contra de bacterias grampositivas y menos contra gramnegativas, también es activa contra algunos protozoos parásitos.

Las tetraciclinas son incompatibles con antibióticos penicilinas y fenicoles. No se recomienda el uso simultáneo con preparados que contengan concentraciones elevadas de calcio, magnesio o sodio. Junto con corticosteroides pueden producir azoemia (elevación anormal de compuestos nitrogenados en sangre).

INDICACIONES: La oxitetraciclina son de elección en el tratamiento de infecciones producidas por *Streptococcus sp.*, *Clostridium sp.*, *Klebsiella pneumoniae*, *Brucella sp.*, *Haemophilus influenzae* y *pertrusis*, *Chlamydia sp.*, *Mycoplasma sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Ehrlichia sp.*, *Haemobartonella sp.*, *Anaplasma sp.*; también pueden emplearse en contra de *Corynebacterium sp.*, *Pasteurella sp.*, *Bacillus anthracis*, *Erisipelotrix rhusiopatiae*, *Listeria monocytogenes*, *Leptospira sp.*, que producen principalmente infecciones respiratorias, digestivas, urinarias, hemáticas y también contra *Moraxella bovis* causante de queratoconjuntivitis en bovinos.

ESPECIES EN LAS QUE SE INDICA: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS: La dosis en todas las especies animales es de 5 a 10 mg por 1 Kg de peso, por lo que deberán administrarse de 1 a 2 ml por cada 10 Kg de peso por vía subcutánea, intramuscular e intravenosa.

En equinos se recomienda utilizar exclusivamente la vía intravenosa lenta.

Por vía intrauterina se recomienda diluir de 25 a 50 ml en bovinos y de 10 a 20 ml en porcinos, en la misma cantidad de solución salina estéril y administrada por medio de sonda.

La duración del tratamiento debe cumplir al menos un régimen de 5 días consecutivos.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: 30 días. Leche: 60 horas.

PRECAUCIONES: La administración intramuscular puede provocar una irritación pasajera. Manténgase al abrigo de la luz directa del sol y en un lugar fresco. Manténgase fuera del alcance de los niños. No se administre a animales hipersensibles a las tetraciclinas. No se administre conjuntamente con productos que contengan sales de calcio.

ADVERTENCIAS: Producto para uso exclusivo en medicina veterinaria.

PRESENTACIONES: Frasco ampula de vidrio con 10, 100 y 500 ml.

HECHO EN MEXICO POR:
VETILAB INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
Fray Martín de Porres N° 101, Boulevares de San Francisco,
Pachuca, Hgo.

DISTRIBUIDO EN EXCLUSIVA POR:
Promoción Veterinaria, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto N° 510, Col. Del Valle, México, D.F., 03100
01-800-717-6240 www.promovet.com.mx ventas@promovet.com.mx

Promoción Veterinaria, S.A. de C.V.

Adolfo Prieto N° 510, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, México, D.F., 03100

(55) 5669-4001 01 (800) 717-6240 www.promovet.com.mx

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL MÉDICO VETERINARIO